

Beter zonder infuus?



Terechte indicaties voor een infuus

- Infusie van vocht
- Intraveneuze toediening van medicatie
- Transfusie van bloed(producten)
- Injectie van contrastmiddelen
- Intraveneuze toegang voor cardiale ritmestoornissen
- Verwachte intraveneuze toediening is kortdurend (≤ 5 dagen)

Onterechte indicaties voor een infuus

- Infusie van vocht en/of medicatie, oraal wel mogelijk
- Verzoek van patiënt
- Moeite met slikken / keelpijn
- Bloedprikken

Bij vragen kun je contact op nemen met Arnold Bank, abank@tergooi.nl



Beter zonder katheter?



Terechte indicaties voor een urinekatheter

- Accuraat monitoren urineproductie bij ernstig zieke patiënt
- Incontinentie i.c.m. open sacrale of perianale wond
- Peri- of postoperatief volgens (lokaal) protocol
- Verbetering kwaliteit van leven in de stervensfase
- Hematurie met stolsels
- Langdurige verplichte immobilisatie of acute ernstige pijn door mobilisatie
- Urineretentie
- Vochtbalans voor diagnostiek (o.a. 24-uurs urine), indien patiënt urine niet zelf kan verzamelen

Onterechte indicaties voor een urinekatheter

- Incontinentie (geen open sacrale of perianale wond)
- Decubituspreventie
- Dagelijkse urineproductie meting voor vochtmanagement of diagnostische test, indien patiënt zelf urine kan verzamelen
- Monitoren (frequent en accuraat) urineproductie, indien patiënt zelf urine kan verzamelen
- Verzoek van patiënt
- Residubepalingen

Bij vragen kun je contact op nemen met Arnold Bank, abank@tergooi.nl

